



Rougequeue noir © Marcel Burkardt

Nichoires pour semi-cavernicoles

Certaines espèces d'oiseaux ont besoin de niches, telles que celles que l'on trouve dans les vieux bâtiments tout en coins et recoins, pour construire leur nid. On parle alors d'espèces semi-cavernicoles. C'est notamment le cas de la bergeronnette grise, du rougequeue noir et du gobemouche gris. Toutefois, les bâtiments modernes ou rénovés leur offrent peu de possibilités. Il est donc pertinent d'aider ces oiseaux en installant des nichoires spéciales pour semi-cavernicoles ou des planches judicieusement placées.

Comment aider les semi-cavernicoles

Les vieux bâtiments tout en coins et recoins, à charpente apparente et dotés d'orielles et de niches offrent au rougequeue noir, à la bergeronnette grise et au gobemouche gris toutes sortes d'endroits où construire leur nid, même sans soutien particulier. Sur les bâtiments modernes et plus sobres aussi, vous trouverez des endroits où poser des aides à la nidification pour les oiseaux. Chaque bâtiment peut abriter sans

problème plusieurs dispositifs, surtout lorsqu'ils sont bien séparés spatialement les uns des autres. L'orientation de la façade ne joue pas un rôle prépondérant.

Reconnaître les endroits adéquats

Installez les aides à la nidification aux endroits abrités de la pluie et du vent, sans exposition directe au soleil. Les chats, les fouines, les corvidés et les autres

prédateurs ne doivent si possible pas pouvoir y accéder. Les recoins tranquilles directement sous le toit ou l'avant-toit, par exemple au niveau du pignon, sous les balcons et sous les poutres et les corniches, sont particulièrement adéquats. Les semi-cavernicoles pénètrent quelquefois à l'intérieur des bâtiments pour nicher, même lorsque les trous d'accès sont étroits. Dans les écuries et les granges, ils occupent volontiers les anciens nids d'hirondelles rustiques.



Le gobemouche gris (à gauche) et la bergeronnette grise (à droite) sont des semi-cavernicoles typiques, qui aiment construire leurs nids dans les niches de bâtiments. © Marcel Burkhardt





Le nichoir triangulaire protège mieux la couvée des prédateurs. © Station ornithologique suisse

Apprécié du rougequeue noir : le nichoir triangulaire

Notre nichoir triangulaire est spécialement apprécié du rougequeue noir. Ses petits barreaux de bois verticaux protègent en grande partie les pontes des pies, des corneilles et des autres pilleurs de nids. Le nichoir s'imbrique particulièrement bien dans l'angle de deux parois attenantes. Il est disponible auprès de la Station ornithologique suisse.



De nombreux bâtiments offrent des lieux de nidification adaptés pour installer des aides à la nidification destinés aux semi-cavernicoles. Les cercles bleus indiquent les endroits adaptés à la nidification et où des aides à la nidification pourraient être installées. Les autres endroits possibles pour installer des nichoirs sont indiqués en rouge. © Nadja Stadelmann



Une simple plateforme en bois vissée au mur suffit souvent pour les semi-cavernicoles. © Station ornithologique suisse

Aides à la nidification simples

En principe, une simple plateforme en bois d'environ 15 × 15 cm et 20 mm d'épaisseur, fixée à la paroi avec une cornière, facilite déjà la nidification des semi-cavernicoles. Cette variante de base peut être complétée suivant la situation locale : un rebord de 2-3 cm minimise le risque de chute du futur nid. Une ou plusieurs parois latérales cachent mieux le nid. Une plateforme munie d'un rebord ou de parois latérales peut aussi avoir une surface plus réduite (au minimum 12 × 12 cm).

Renforcer les sites de nidifications existants

Vous pouvez améliorer de manière similaire les sites de nidification existants sur les poutres métalliques ou en bois, les tuyaux, les corniches, les lampes et les autres objets servant de support de nids.

Nettoyage

Nettoyez les nichoirs une fois par année, de préférence en automne ou en hiver. Si vous avez observé l'envol des jeunes de la

première nichée, il est conseillé d'éliminer le nid tout de suite pour qu'une deuxième puisse avoir lieu dans le même nichoir. Le rougequeue noir et la bergeronnette grise utilisent certes de temps en temps leur premier nid pour la deuxième nichée, mais on peut leur en faire construire un deuxième. En cas d'infestation particulièrement intense de parasites, nettoyez le nichoir avec de l'eau chaude et du savon noir. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez simplement ôter l'ancien nid.

IMPRESSUM

© Station ornithologique suisse et BirdLife Suisse, Sempach et Zurich, 2023
La reproduction du texte en citant la source est souhaitée.

Schweizerische Vogelwarte | Seerose 1 | 6204 Sempach | T +41 41 462 97 00 | info@vogelwarte.ch | www.vogelwarte.ch
BirdLife Schweiz | Postfach | 8036 Zürich | T +41 44 457 70 20 | info@birdlife.ch | www.birdlife.ch